

Wat u moet weten bij gebruik van Thiamazol (Strumazol), Carbimazol of PTU (Propylthiouracil)



HET VAN WEEL-BETHESDA ZIEKENHUIS

Hoofdlocatie:
Stationsweg 22
3247 BW Dirksland

vanweelbethesda.nl
mijn.vanweelbethesda.nl
0187 60 73 00

In overleg met uw internist gaat u een van volgende medicijnen gebruiken: Thiamazol (Strumazol), Carbimazol of PTU (Propylthiouracil). Deze medicijnen worden als geneesmiddel gebruikt bij patiënten met een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie). Hier krijgt u advies wat u moet doen bij koorts én keelpijn of jeuk, wanneer u een van deze medicijnen gebruikt.

Te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie)

Wanneer uw schildklier te snel werkt, heeft u een teveel aan schildklierhormoon in uw bloed. Daardoor kunnen diverse klachten ontstaan: vermoeidheid, gejaagdheid, bonkende hartslag, kortademigheid, nervositeit, spierpijn, diarree en vermagering. Door het geven van medicijnen (thyreostatica) kan de werking van de schildklier geremd worden. De schildklier geeft dan minder schildklierhormoon af. Medicijnen met deze werking zijn: Thiamazol (Strumazol), Carbimazol en Propylthiouracil (PTU).

Ernstige bijwerkingen

Net als veel andere geneesmiddelen kunnen deze medicijnen soms ook bijwerkingen hebben. De meest ernstige bijwerking is een verstoring van de aanmaak van witte bloedcellen in het beenmerg. De witte bloedcellen zijn nodig voor de afweer tegen infecties. De belangrijkste verschijnselen zijn koorts (boven de 38,5 °C) en keelpijn. Deze bijwerking is zeldzaam (1 op de 1000 patiënten) en kan van de ene op de andere dag ontstaan. Regelmatig bloedonderzoek voor controle van de witte bloedcellen is daarom niet zinvol.

Tevens kunnen er allergische reacties ontstaan in de vorm van jeukklachten en huiduitslag.

Contact opnemen

Heeft u koorts én keelpijn? Stop dan onmiddellijk het gebruik van uw medicijn en neem direct contact op met uw behandelend internist of huisarts. Hij/zij kan ervoor zorgen dat dezelfde dag uw bloed wordt onderzocht. Bij het stoppen van het geneesmiddel treedt vrijwel altijd volledig herstel op van de witte bloedlichaampjes. Uw behandelend internist of huisarts bepaalt het verdere beleid met u (bijvoorbeeld start andere medicijnen of antibiotica).

Heeft u jeuk of huiduitslag? Neem dan contact (vervroeg de afspraak) op met uw behandelend internist. U hoeft niet direct te stoppen met de medicijnen. Uw behandelend internist zal het te volgen beleid met u bespreken.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan in uw persoonlijk PatiëntenPortaal, op onze website of vraag het aan uw zorgverlener via de BeterDichtbij app of telefonisch.

PatiëntenPortaal

Op ons PatiëntenPortaal mijn.vanweelbethesda.nl kunt u terecht voor veilige toegang tot uw medisch dossier, persoonlijke gegevens, het maken en inzien van afspraken en voorlichting over uw aandoening en/of behandeling. Het portaal is toegankelijk met behulp van uw DigiD.

BeterDichtbij app

Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener. Wanneer uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer correct geregistreerd zijn in ons systeem, ontvangt u na het maken van uw eerste afspraak een uitnodiging voor deze app.

Hulp nodig bij het PatiëntenPortaal of BeterDichtbij?

Neem contact op met de Digihulp van CuraMare via digihulp@curamare.nl of 0187 89 10 10 (tijdens kantooruren).

Vergoeding van uw zorgkosten

Niet alle zorg in het ziekenhuis wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt ook altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in ons ziekenhuis vergoed wordt.

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is
onderdeel van:



CURAMARE

Ouderenzorg - Thuiszorg - Ziekenhuiszorg